Scheda Tecnica

T-R 5 BROMA BLOCK

T-R 5 BROMA BLOCK

Esca rodenticida pronta all'uso in blocchetti paraffinati, con semi di girasole

Titolare dell'autorizzazione

Vebi Istituto Biochimico S.r.l.
Via Desman, 43 35010 Borgoricco (PD), Italia
Tel. +39 049 9337111
www.vebi.it

Officina di produzione

Abiotech Institute S.r.l.
Via Desman, 43 35010 Borgoricco (PD), Italia

Registrazione

PRODOTTO BIOCIDA (PT14)
Aut. Min. della Salute n. IT/2014/00185/AUT

Composizione

100 g di prodotto contengono:

Bromadiolone (N°CAS 28772-56-7)	0,005 g
Denatonio Benzoato (N°CAS 3734-33-6)	0,001 g
Coformulanti	q.b. a 100 g

Specifiche Prodotto

Codice	Confezione	Pallet
102343	Secchio 5 kg	65 secchi
102344	Cartone 20 kg	24 cartoni

Caratteristiche Tecniche e Istruzioni d'uso

T-R 5 BROMA BLOCK è un'esca rodenticida pronta all'uso a base di Bromadiolone, efficace contro topi e ratti anche dopo una singola ingestione. La formulazione in forma di blocchetto paraffinato è arricchita di speciali componenti, tra cui i semi di girasole, ed è stata studiata per ottenere la massima efficacia verso tutte le specie di roditori sopra riportate, anche in presenza di forte competizione alimentare. Il prodotto non allerta e non crea sospetti agli altri componenti della popolazione di roditori.
T-R 5 BROMA BLOCK può essere usato all'interno e intorno a edifici industriali (inclusi magazzini, depositi, stive delle navi), rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, ripostigli, giardini di pertinenza.

Dosi e modalità di impiego

Da utilizzare esclusivamente in contenitori per esche a prova di manomissione, debitamente marcati.

DOSI D'IMPIEGO:
Per il controllo del Topolino domestico (*Mus musculus*).
Posizionare 50 g di T-R 5 BROMA BLOCK per contenitore. Laddove dovessero essere necessari più contenitori posizionarli ad una distanza di circa 5 metri l'uno dall'altro e ridurli a 2 in caso di forti infestazioni. I contenitori dovrebbero essere ispezionati ogni 2-3 giorni all'inizio del trattamento e poi almeno settimanalmente.
Per il controllo del Ratto grigio (*Rattus norvegicus*).
Posizionare 200 g di T-R 5 BROMA BLOCK per contenitore. Laddove dovessero essere necessari più contenitori posizionarli ad una distanza di circa 10 metri l'uno dall'altro e ridurli a 2 in caso di forti infestazioni. I contenitori dovrebbero essere ispezionati ogni 5-7 giorni all'inizio del trattamento e poi almeno settimanalmente.
Per il controllo del Ratto nero (*Rattus rattus*).
Posizionare 200g di T-R 5 BROMA BLOCK per contenitore. Laddove dovessero essere necessari più contenitori posizionarli ad una distanza di circa 10 metri l'un dall'altro e ridurli a 5 ini caso di forti infestazioni. I contenitori con le esche dovrebbero essere controllati almeno ogni 5-7 giorni all'inizio del trattamento e almeno settimanalmente in seguito.

USO IN FOGNATURA
Ratto grigio (*Rattus norvegicus*): fino a 250 g per punto esca.

USO IN TANA
Topolino domestico (*Mus musculus*), Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) e **Ratto nero (*Rattus rattus*):** fino a 60 g per tana.

Vebi Istituto Biochimico S.r.l.
Via Desman, 43 35010 Borgoricco (PD)
Tel: +39 049 9337111
www.vebi.it

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO:
Bleu Line S.r.l.
Via Virgilio, 28 47122 Z.I. Villanova, Forlì (FC)
Tel: +39 0543 754430
www.vebi4farm.com