



## Caratteristiche Tecniche e Istruzioni d'uso

**DERMAG+** è un sistema biologico costituito da un formidabile mix di predatori naturali, che si completano, l'uno con l'altro, in un controllo molto efficace del "pidocchio rosso" del pollo (*Dermanyssus gallinae*). Questi predatori, in particolare *Androlaelaps casalis* e *Cheyletus eruditus*, sono essi stessi degli acari che, essendo di dimensioni più ridotte, se rilasciati nei punti chiave dell'allevamento, si spostano alla ricerca del pidocchio rosso e sono in grado di raggiungerlo ed eliminarlo anche nei piccoli anfratti più remoti, dove i prodotti chimici, spesso, non riescono ad arrivare. Gli acari predatori si cibano della preda a qualsiasi stadio essa sia: uova, larva, ninfa e adulto e ristabiliscono un equilibrio naturale all'interno dell'allevamento ma, allo stesso tempo, sono del tutto innocui, verso persone e animali.

È un prodotto facile da usare, non richiede nessuna attrezzatura, è sicuro per gli operatori e la sua applicazione fa risparmiare molto tempo rispetto ai trattamenti chimici o similari, soprattutto quando siamo in presenza di animali.

**DERMAG+** non crea resistenza ed il suo mix si adatta a tutte le situazioni ambientali che si possono creare negli allevamenti. Può resistere, senza nutrirsi, anche lungo tempo in assenza di prede.

### Confezioni:

1. **DERMAG+** (*Androlaelaps casalis*) secchiello in plastica da 100.000 predatori
2. **DERMAG+** (*Cheyletus eruditus*) secchiello in plastica da 400.000 predatori
3. **DERMAG+** (*Androlaelaps casalis*) bottiglia in plastica (dispenser) da 10.000 predatori + staffa di aggancio.

Le confezioni 1 e 2, insieme formano il **MIX DERMAG+**, con un totale di 500.000 predatori

## Dosi e modalità di impiego

**DERMAG+** può essere usato sia preventivamente, cioè in assenza ancora delle prime forme mobili del "pidocchio" (impiego questo da preferire), sia alla vista delle primissime forme mobili. Il dosaggio degli acari predatori, non segue le linee degli altri tipi di trattamenti, ed è fortemente dipendente dal livello di infestazione e dal sistema di allevamento.

Infatti, **DERMAG+** non agisce come un insetticida ma deve colonizzare l'ambiente, dopodiché, il pidocchio rosso non riesce più a prendere il sopravvento.

Il **MIX DERMAG+** è sufficiente per controllare il "pidocchio rosso" su circa 1500 galline (numero indicativo standard). I trattamenti possono essere da 2 a 3 all'anno, a distanza di circa 1 mese uno dall'altro. L'eventuale terzo trattamento è da verificare a seconda dei casi e del grado di infestazione.

Il **MIX DERMAG+** è adatto, particolarmente, agli allevamenti a terra delle galline ovaiole. Il contenuto dei secchielli deve essere sparso nei nidi, sotto il grigliato e in tutte le zone dove il pidocchio rosso si può sviluppare. La confezione con la bottiglia di plastica (dispenser), può essere posizionata sui posatoi, usando l'apposita staffa.

## DERMAG+

Mix di predatori naturali per il controllo dell'acaro rosso del pollo (*Dermanyssus gallinae*)

### Specifiche Prodotto

Codice	Descrizione	Confezione
102480	Secchio 400.000 predatori	1 pz
102481	Secchio 100.000 predatori	1 pz
102482	Bottiglia 10.000 predatori	1 pz