



Caratteristiche Tecniche e Istruzioni d'uso

PREDO+ è un insetto utile predatore di diversi tipi di mosca, specialmente di *Musca domestica*. Esso è particolarmente efficace per il controllo di questo dittero negli allevamenti suinicoli su grigliato che sono caratterizzati da deiezioni fluide (liquami) e/o melmose, dove le larve di mosca domestica si riproducono in grande quantità. Può essere utilizzato anche per i vitelli bovini che vengono allevati, anch'essi su grigliato, in ambienti chiusi.

L'insetto **PREDO+** è una particolare specie di mosca (*Hydrotaea aenescens, ex Ophyra*), simile alla mosca domestica, ma, a differenza di quest'ultima, è più piccola e di un colore nero/lucido, del tutto innocua e non attratta da persone, animali e piante. Questo predatore agisce quando è nello stadio di larva e, stazionando in prossimità del liquame, nel punto di contatto fra la frazione solida e liquida, si nutre delle larve della mosca domestica che si riproducono nello stesso punto. Durante l'arco della sua vita, ogni larva predatrice può nutrirsi di più di 60 larve di mosca domestica. È importante che, in tale area, non vi siano residui di mangime perché penalizzerebbero la predazione.

Quando **PREDO+** si trasforma in insetto adulto, evita la luce e staziona prevalentemente nelle zone sotto i grigliati oppure nella parte basale dei muri, senza volare e senza infastidire gli animali.

Dosi e modalità di impiego

La distribuzione di questo insetto predatore è molto semplice, veloce e sicura. Essa si avvale dell'apporto di un apposito dispenser (stazione di rilascio), progettato per essere riutilizzato molte volte.

Dosaggio: una confezione di **PREDO+** contiene circa 9.000 predatori e copre una superficie pari a circa 90/100mq di grigliato.

Al ricevimento della confezione in busta, il suo contenuto va immediatamente riversato dentro l'apposita stazione di rilascio ed agganciato in alto, centralmente rispetto alla superficie da coprire, fuori dalla portata degli animali. Gli adulti di **PREDO+** fuoriescono agevolmente dall'apposito dispenser e si spostano sotto il grigliato, in prossimità della parte più solida a contatto con il liquame, dove deporranno le uova che daranno origine alle larve predatrici.

Frequenza: alla prima comparsa delle mosche, si comincia con un doppio lancio iniziale, seguito da un lancio singolo dopo 15gg e un altro lancio singolo dopo altri 15gg. A questo punto si prosegue con un lancio al mese (dose di mantenimento) per almeno 6 mesi. (vedi schema sottostante).

Superficie mq	1° mese		2° mese		3° mese		4° mese		5° mese		6° mese		TOTALE
	Inizio trattamento	Dopo 15gg	Dopo 15gg	Dopo 15gg	Dopo 15gg	Dopo 15gg	Dopo 15gg	Dopo 15gg	Dopo 15gg	Dopo 15gg	Dopo 15gg	Dopo 15gg	
100	2	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	8

PREDO+

Insetto utile predatore

Specifiche Prodotto

Codice	Descrizione	Confezione
102478	Busta di carta 9.000 pupe	1 pz
102479	Secchio di plastica verde	1 pz